

**АЛЬБЕНДАЗОЛ ПОРОШОК 10%**  
**(порошок для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Білий або білий з сіруватим або жовтуватим відтінком порошок з специфічним запахом. Допускаються крапління.

**Склад**

100 г препарату містить діючу речовину:  
альбендазол – 10 г.

**Фармакологічні властивості**

**ATCvet QP52A, антигельмінтні ветеринарні препарати (ATCvet QP52AC11, альбендазол)**

Альбендазол належить до групи бензімідазолів, які гальмують полімеризацію тубуліну в мікротубуліні, в результаті чого порушується надходження і внутріклітинне транспортування поживних речовин і обміну субстратів речовин (аденозинтрифосфорної кислоти і глюкози), а також знижуються мітохондріальні реакції шляхом гальмування фумаратредуктази, що викликає загибель паразитів.

При пероральному введенні препарату альбендазол всмоктується у травному каналі та проникає в органи та тканини; із організму виводиться в основному сечею та фекаліями.

**Застосування**

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець і кіз, свиней, птиці при ураженні нематодами травного каналу та дихальних шляхів, цестодами і трематодами:

велика рогата худоба, вівці, кози:

нематоди – *Haemonchus spp.* (гемонхоз), *Nematodirus spp.* (нематодироз), *Chabertia spp.* (хабертіоз), *Bunostomum spp.* (буностомоз), *Oesophagostom spp.* (езофагостомоз), *Trichuris spp.* (трихуроз), *Strongyloides spp.* (стронгілоїдоз), *Dictyocaulus spp.* (диктіокаульоз), *Protostrongyloides spp.* (протостронгілоїдоз), *Muellerius spp.* (мюллеріоз);

цестоди – *Moniesia spp.* (монієзіоз), *Thysanitiesia giardi* (тизанієзіоз);

трематоди – *Fasciola spp.* (лише статевозрілі - фасціольоз), *Dicrocoelium lanceatum* (дикроцеліоз);

свині:

нематоди – *Ascaris suum* (аскароз), *Oesophagostomum spp.* (езофагостомоз), *Trichuris suis* (трихуроз), *Strongyloides ransomi* (стронгілоїдоз), *Metastrongylus spp.* (метастронгілоїдоз);

спортивні коні:

нематоди – *Oxyuris equi* (оксіуроз), *Strongylus spp.* (стронгілоїдоз), *Parascaris equorum* (параскароз), *Parafilaria multipapillosa* (парафіляріоз);

цестоди – *Anoplocephalidis spp.* (аноплоцефалідоз).

**Дозування**

Альбендазол порошок 10% застосовується перорально одноразово в суміші з кормом у дозах:

<b>Вид тварин</b>	<b>Вид гельмінтів</b>	<b>Дозування г/100 кг маси тіла</b>
<b>Велика рогата худоба</b>	Нематоди, цестоди	7,5
	Трематоди	10,0
<b>Вівці, кози</b>	Нематоди, цестоди	5,0
	Трематоди	10,0
<b>Свині</b>	Нематоди	10,0
<b>Коні</b>	Нематоди	8,0
<b>Птиця</b>	Нематоди, цестоди, трематоди	8,0

**Застереження**

Забій тварин на м'ясо дозволяється через 14 діб після останнього застосування препарату. У випадку забою тварин раніше встановленого терміну м'ясо згодують м'ясоїдним тваринам.

**Форма випуску**

Пакети подвійні з поліетиленової плівки по 20 кг; пластмасові контейнери по 0,5 кг.

**Зберігання**

Зберігають в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Термін придатності**

3 роки.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Назва та місце знаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника**

ТОВ «Агрофарм»

Україна, 08200, Київська обл.,

м. Ірпінь, вул. Центральна, 113-А